



Purina®

MÉDICAMENTÉ

Purina® Purinature AMP Poussin Début et Croissance Plus - Médicamenté

Concassé fin

Les moulées Purina® Purinature offrent une nutrition complète à votre élevage. Les formules des moulées Purina Purinature contiennent une combinaison exclusive d'ingrédients, de vitamines prébiotiques et de minéraux organiques pour aider votre élevage à rester en bonne santé et à produire les œufs ou la viande dont votre famille a besoin.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contient 20% de protéines pour aider vos poussins à grandir en bonne santé et en force.

Une alimentation saine pour les poussins, de l'éclosion à l'âge de 16 semaines.

Combinaison exclusive d'ingrédients, de prébiotiques et d'oligo-éléments organiques pour soutenir la performance de l'élevage.

Enrichi en vitamines et minéraux dont les poussins ont besoin dès leur plus jeune âge.

Contient de l'Amprolium pour la prévention de la coccidiose.

Sous forme de concassé pour une consommation facile par les poussins.

Purina® Purinature AMP Poussin Début et Croissance Plus - Médicamenté

TEXTURE

Concassé fin

TAILLE DU SAC

25kg

STADE DE VIE

0 à 16 semaines

ANALYSE GARANTIE

PROTÉINES BRUTES	MIN.	20,0 %
MATIÈRES GRASSES BRUTES	MIN.	3,0 %
FIBRES BRUTES	MAX.	5,0 %
CALCIUM	MIN.	1,0 %
PHOSPHORE	MIN.	0,75 %

SODIUM	RÉEL	0,18 %
VITAMINE A	MIN.	10 000 UI/kg
VITAMINE D	MIN.	2 800 UI/kg
VITAMINE E	MIN.	30,0 UI/kg
SÉLÉNIUM		0,30 mg/kg

MODE D'EMPLOI

Nourrir Purinature AMP Poussin Début et Croissance Plus – Médicamenté comme seul régime à partir de l'éclosion.

À l'âge de 16 semaines ou au début de la ponte, remplacer l'alimentation par Purinature Layena Plus.

- Ne laissez pas les mangeoires se vider.
- Nettoyez régulièrement les mangeoires et les abreuvoirs.
- Fournir de l'eau fraîche et propre en permanence.

IMPORTANT

Respectez des pratiques de gestion saines ainsi que des mesures de contrôle des maladies et de l'hygiène. Si vous avez des questions, contactez votre vétérinaire, votre détaillant ou votre représentant Purina.

AVERTISSEMENT


Ne pas servir aux poules pondeuses en cours de production.

ATTENTION

1. Ne pas utiliser de moulée médicamenteuse à l'amprolium pour traiter les foyers de coccidiose.
2. En cas de mortalité inattendue, obtenir un diagnostic précis et suivre les recommandations d'un vétérinaire ou d'un pathologiste de la volaille.
3. Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.
4. Les aliments sont périssables. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des rongeurs et des insectes. Ne pas donner d'aliments moisis ou infestés d'insectes aux animaux, car ils peuvent provoquer des maladies, des avortements ou la mort.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les résultats individuels de l'utilisation de ce produit peuvent varier en fonction des différences dans les programmes de gestion, de santé, d'hygiène, d'élevage, de génétique et d'alimentation des clients. Par conséquent, Cargill Limited et ses détaillants ne garantissent pas les résultats individuels.



PURINA®